

| | |
|------------------------|---|
| <i>kaempferi</i> | d'après Engelbert Kaempfer (1651-1716) physicien, écrivain et collecteur botanique. |
| <i>kanehirae</i> | d'après Ryozo Kanehira (1882-1947) botaniste japonais. |
| <i>kansuense</i> | de l'Ouest de Gnasu, près de la frontière tibétaine. |
| <i>kasoense</i> | du Pic Kaso (Assam). |
| <i>kawakami</i> | d'après Takiya Kawakami (1871-1915) qui collecta à Taiwan. |
| <i>keiskei</i> | d'après Keisuke Ito (1803-1901) botaniste japonais qui le découvrit. |
| <i>var. cordifolia</i> | à feuilles en forme de cœur. |
| <i>kemulense</i> | du Mont Kemul (Bornéo). |
| <i>kendrickii</i> | d'après le Dr G. Kendrick (1771-1847) ami du botaniste Dr Nuttall. |
| <i>keysii</i> | d'après son découvreur Mr. Keys. |
| <i>kiusianum</i> | de Kyushu (Japon). |
| <i>kiyosumense</i> | du Mont Kiyosumi (Japon). |
| <i>kochii</i> | d'après O. Koch zoologiste allemand qui collecta des plantes aux Philippines. |
| <i>kongboense</i> | de Kongbo (S.E. du Tibet). |
| <i>konori</i> | d'après un Dieu en Nouvelle-Guinée. |
| <i>korthalsii</i> | d'après Pieter W. Korthals (1807-1892). |
| <i>kuluense</i> | des montagnes de Kulu (Sichuan). |
| <i>kyawii</i> | d'après Maung Kyaw un collecteur de plantes birman. |

